Request d Patent:

EP0242666A1

Title:

THIODIAZOLYLUREA-CONTAINING AGENT FOR DEFOLIATING PLANTS;

Abstracted Patent:

US4921525;

Publication Date:

1990-05-01;

Inventor(s):

GROSSMAN KLAUS (DE); JUNG JOHANN (DE); SCHULZ GUENTER (DE); SAUTER HUBERT (DE); HOFMEISTER PETER (DE); TUERK WOLFGANG (DE);

Applicant(s):

BASF AG (DE);

Application Number:

US19880258058 19881014;

Priority Number(s):

DE19863612830 19860416;

IPC Classification:

A01D43/28 ;

Equivalents:

AU601177, AU7155887, DE3612830, IL82137, JP62249903, ZA8702693

ABSTRACT:

An agent for defoliating plants, which contains a 1,3,4-thiadiazol-2-ylurea of the formula I (I) where R1 is hydrogen or methyl, and R2 is C1-C6-alkyl, C3-C8-cycloalkyl, C2-C4-alkenyl, C3-C6-alknyl or phenyl which is unsubstituted or substituted by one or 2 chlorine or fluorine atoms, methyl groups, trifluoromethyl groups or methoxy groups, a process for the preparation of the agent, and its use in a method for defoliating plants.

(1) V röffentlichungsnummer:

0 242 666

A1

(E)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 87104956.5

(5) Int. Cl.4: A01N 47/36 , C07D 285/12

- 2 Anmeldetag: 03.04.87
- 3 Priorität: 16.04.86 DE 3612830
- (3) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 28.10.87 Patentblatt 87/44
- Benannte Vertragsstaaten:
 AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

Anmelder: BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 D-6700 Ludwigshafen(DE)

22 Erfinder: Grossmann, Klaus, Dr. Wilhelm-Busch-Strasse 5
D-6703 Limburgerhof(DE)
Erfinder: Jung, Johann, Prof.Dr. Hardenburgstrasse 19
D-6703 Limburgerhof(DE)
Erfinder: Schulz, Guenter, Dr. Carl-Bosch-Strasse 96
D-6700 Ludwigshafen(DE)
Erfinder: Sauter, Hubert, Dr. Neckarpromenade 20
D-6800 Mannheim 1(DE)
Erfinder: Hofmelster, Peter, Dr. Bernhard-Humblot-Strasse 12
D-6730 Neustadt(DE)
Erfinder: Tuerte Wolfgang, Dr.

D-6730 Neustadt(DE) Erfinder: Tuerk, Wolfgang, Dr. Wittelsbachstrasse 61 D-6700 Ludwigshafen(DE)

- (6) Thiadiazolylharnstoff enthaltendes Mittel zur Entblätterung von Pflanzen.
- (5) Mittel zur Entblätterung von Pflanzen, gekennzeichnet durch einen Gehalt an einem 1,3,4-Thiadiazol-2-yl-hamstoff der Formel I

12 666 A1

in dei

R1 für Wasserstoff oder Methyl und

R² für C₁ -C₆-Alkyl, C₃ -C₇-Cycloalkyl, C₂ -C₆-Alkenyl, C₃ -C₆-Alkinyl und Phenyl, das ggf. mit bis zu 2 Chloroder Fluoratomen, Methylgruppen, Trifluormethylgruppen oder Methoxygruppen substituiert ist, steht, Verfahren zur Herstellung des Mittels und seine Anwendung in einem Verfahren zur Entblätterung von Pflanzen.

Thiadiazolylharnstoff enthaltendes Mittel zur Entblätterung von Pflanzen

Die Erfindung betrifft Mittel zur Entblätterung von Pflanzen auf d r Grundlage eines Thiadiazolylharnstoffs, Verfahren zur Herstellung dieser Mittel und ihre praktische V rwendung.

Für die Abtrennung von Pflanzen rganen wie Blättern. Blüten und Früchten vom Pflanz nkörper sind spezielle Gewebebereiche an der Basis der Blatt-bzw. Blüten-und Fruchtstiele verantwortlich. Bei Einsetzen des Trennungsprozesses werden die Wände der Zellen dieser Trennzone durch gesteigerte Pectinase-und Cellulasebildung weich, so daß eine Abtrennung des Organs (Abszission) durch mechanische Kräfte. z.B. durch Wind oder durch das eigene Gewicht möglich wird (Dörffling, Das Hormonsystem der Pflanzen, Georg Thieme Verlag, 1982).

1,2,3-Thiadiazol-5-yl-hamstoffe finden Verwendung als künstliches Abszissionsmittel (der Wirkstoff ines Handelsproduktes ist N-Phenyl-N'-(1,2,3-thiadiazol-5-yl)-hamstoff vgl. DE-OS 25 06 690 und 26 19 861). Der bisher verwendete Wirkstoff zeigt jedoch eine starke Abhängigkeit des Entblätterungserfolges von den Temperaturverhältnissen, was die Anwendung in Anbauzonen mit geringer Temperatur verhindert und durch die Unkalkulierbarkeit temporärer Temperaturschwankungen die Wirkungssicherheit stark beeinträchtigt 1,3,4-Thiadiazol-2-yl-hamstoffe sind ebenfalls bekannt, z.B. aus J. Med. Chem. 22, 28ff; J. Med. Chem. 15, 1082 ff; DE-OS 19 23 939; JA-Pat. veröfft. 74-8253. Dort ist ihre Anwendung als Herbizide, Fungizide und pharmakologische Wirkstoffe beschrieben. Unbekannt ist ihre Verwendung als pflanzenverträgliche Abszissionsmittel zur gezielten Induktion des Abwurfes von Blättern, Blüten oder Früchten bei Kulturpflanzen, wie z.B. Baumwolle, Citrus, Oliven und Kern-und Steinobstsorten. Insbesondere bei Baumwolle besteht ein starkes wirtschaftliches Interesse an Abszissionsmitteln aus Gründen der Ernteerleichterung. Überraschenderweise übertreffen nun Mittel, die als Wirkstoff eine Verbindung der Formel 1

in der

25

R' für Wasserstoff oder Methyl und

R² für C1 - C6-Alkyl, C3 - C3-Cycloalkyl, C2 - C3-Alkenyl, C3 - C6-Alkinyl und Phenyl, das ggf. mit bis zu 2 Chlor-oder Fluoratomen, Methylgruppen, Trifluormethylgruppen oder Methoxygruppen substituiert ist, steht, in wirksamer Konzentration enthalten, die bekannten Mittel, die auf isomeren Wirkstoffen basieren, erh blich in bezug auf Wirkungsintensität, Wirkungsgeschwindigkeit. Besonders ist die unerwartet deutliche Entblätterungswirkung bei relativ tiefen Temperaturen hervorzuheben, die die Anwendungssicherheit wesentlich erhöht.

Die Mittel werden den Pflanzen vornehmlich durch Blattspritzung zugeführt. Dabei kann die Ausbringung z.B. mit Wasser als Trägerstoff durch übliche Spritztechniken mit Spritzbrühenmengen von etwa 100 bis 1000 I/ha erfolgen. Eine Anwendung der Mittel im sogenannten "Low Volume"-und "Ultra-low-Volume"-Verfahren ist ebenso möglich wie ihre Applikation in Form von sogenannten Mikrogranulaten. Infolge der hohen Pflanzenverträglichkeit kann die Aufwandmenge an Wirkstoff stark variieren. Für die Blattbehandlung sind im allgemeinen Gaben von 0,01 bis 5 kg a. i./ha ausreichend.

Die Mittel können einfach durch Mischen einer wirksamen Menge einer Verbindung der Formel I mit geeigneten flüssigen oder festen Trägerstoffen und/oder Zusatz von oberflächenaktiven Stoffen erhalten werden.

Geeignete flüssige Trägerstoffe sind z.B. Wasser, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe, wie Benzol, Toluol, Xylol, Cyclohexanon, Isophoron, Dirnethylsulfoxyd, Dirnethylformiad, weiterhin Mineralölfraktionen. Als feste Trägerstoffe eignen sich Mineralerden, z.B. Tonsil, Silicagel, Talkurn, Kaolin, Attaclay, Kalkstein, Kieselsäure und pflanzliche Produkte, z.B. Mehle.

An oberflächenaktiven Stoffen sind zu nennen: z.B. Calciumligninsulfonat, Polyoxyethylen-octylphenolether, Naphthalinsulfonsäuren und deren Salze, Phenolsulfonsäuren und deren Salze, Formaldehydkondensate, Fettalkoholsulfate sowie substituierte Benzolsulfonsäuren und deren Salze.

Der Anteil des bzw. der Wirkstoffe(s) in den konzentrierten Zubereitungen kann in weiten Grenzen variieren. Beispielsweise enthält ein Mittel etwa 10 bis 80 Gew.-% Wirkstoff, etwa 30 bis 90 Gew.-% flüssige od r feste Trägerstoffe sowie ggf. bis zu 20 Gew.-% oberflächenaktive Stoffe. Es kann bei Bedarf auf eine geeignete Anwendungskonzentration verdünnt werden.

Die zugrundeliegenden Wirkstoffe können auf bekannte Weise erhalten werden; z.B. durch die Umsetzung von 2-Amino-1,3,4-Thiadiazol oder 2-Amino-5-methyl-1,3,4-Thiadiazol mit einem geeigneten Isocyanat:

$$R^{1} \longrightarrow NH_{2} + 0 = C = N - R^{2}$$

$$\longrightarrow R \longrightarrow NH_{2} + 0 = C = N - R^{2}$$

$$\longrightarrow R \longrightarrow NH_{2} + 0 = C = N - R^{2}$$

Dieser Reaktionstyp ist zusammenfassend z.B. beschrieben in "The chemistry of cyanates and their thio derivatives" Hrsg. S. Patai, (1977). Nachfolgend sind Beispiele für Verbindungen der Formel I in einer Liste zusammengestellt, der sich Beispiele zur biologischen Wirksamkeit der Mittel anschließen.

Die erfindungsgemäßen Mittel können entweder für sich allein, in Mischung mit anderen Mitteln od r mit anderen Wirkstoffen angewendet werden. Gegebenenfalls können andere Entblätterungs-, Pflanzenschutz-oder Schädlingsbekämpfungsmittel je nach dem gewünschten Zweck zugesetzt werden.

Tabelle 1: Verbindungen

75

20

25 Nr. R ¹ R ²	Fp. ⁰ C
1 H -CH ₃	
2 H -C4H8	
30 3 H -CH(CH ₃) ₂	
4 H -CH ₂ CH(CH ₃) ₂	171
5 H Cyclopentyl	210-12
35 6 H Cyclohexyl	211-14
7 H -CH ₂ -CH=CH ₂	235-36
8 H -C(CH ₃) ₂ -C≡CH	210
9 H -C6H5	> 230
10 H -(4-C1-C6H4)	
11 H -(4-CH ₃ -C ₆ H ₄)	
12 H -(2-F-C ₆ H ₄)	> 230
45 13 H -(3-Cl-C ₈ H ₄)	> 230
14 H -(3,4-Cl ₂ -C ₆ H ₃)	> 230
15 H -(3-CF ₃ -C ₆ H ₄)	> 230
50 16 H -(3-0CH ₃ -C ₆ H ₄)	> 230
17 -CH ₃ -C ₆ H ₅	> 230
18 -CH ₃ -(4-CH ₃ -C ₆ H ₄)	
19 -CH ₃ -(4-Cl-C ₆ H ₄)	•
20 -CH ₃ -2(2-F-C ₆ H ₄)	

Anwendungsbeispiele

Beispiel A

Junge Baumwollpflanzen (Sorte Delta Pine, Entwicklungsstadium 5 -6 entwickelte Laubblätter) wurden unter Gewächshausbedingungen angezogen (Tag/Nachttemperatur 26/16°C, relat. Luftfeuchte 50 - 70%) und tropfnaß mit den unten angegebenen Wirkstoffen unter Zusatz von 1 % Citowett in wäßriger Lösung blattbehandelt. Fünf und sieben Tage nach Wirkstoffapplikation wurde die Anzahl abgeworfener Blätter und der Grad der Entblätterung in % zur Kontrolle angegeben.

10:

Mittel, enthaltend	Umgerechnete	7 Entblätterung nach	
Wirkstoff Nr.	Aufwandmenge kg/ha	5	7 Tagen
9 formuliert in	3	83	86
9 Tween 85 €	5	95	98
Endmenge	•		
5 Gew1			
17 formuliert in	5	82	· 84
Tween 85 €			
Endmenge			
5 Gew1			
Vergleichsmittel Vergleichsmittel		•	<u> </u>
N-Phenyl-N'-(1,2,3-	3	36	45
thiadiazol-5-yl)-	5	41	54
harnstoff			
(Handelsprodukt)			
Unbehandelt	-	0	Q

40

 $\ensuremath{\Theta}$ Tween 85 ist ein Netzmittel auf der Grundlage von Polyoxyethylensorbitan-Trioleat

45

Beispiel B

Junge Baumwollpflanzen wurden wie in Beispiel A unter Gewächshausbedingungen angezogen. Nach der Blattbehandlung - wie in Beispiel A beschrieben - mit den unten angegebenen Mitteln wurd n die Pflanzen in speziellen Klimaräumen bei geringeren Temperaturbedingungen (Tag-/Nachttemperatur 22/13°C) weiterkultiviert. Eine Woche nach Applikation der Mittel wurde die Anzahl abgeworfener Blätter bestimmt und der Grad der Entblätterung in % zur Kontrolle angegeben.

55

Mittel, nthaltend Wirkstoff Nr.	Umgerechnete Aufwandmenge kg/ha	1 Entblätterung nach1 Woche
9 formuliert in Tween 85, ⊕ Endmenge 5 Gew%	3	65
Vergleichsmittel: N-Phenyl-N'-(1,2,3- thiadiazol-5-yl)- harnstoff (Handelsprodukt)	3	9
Unbehandelt .	-	• 0

Die Ergebnisse aus Beispiel A und B zeigen, daß die erfindungsgemäßen Mittel unter bestimmten Temperaturverhältnissen sowohl hinsichtlich Wirkungsgeschwindigkeit dem handelsüblichen Wirkstoff deutlich überlegen sind und ihre gute Wirkung als Entblätterungsmittel auch bei geringen Temperaturen entfalten.

Ansprüche

30

35

1. Mittel zur Entblätterung von Pflanzen, gekennzeichnet durch einen Gehalt an einem 1,3,4-Thiadiazol-2-yl-harnstoff der Formel I

in der

R' für Wasserstoff oder Methyl und

 R^2 for C_1 - C_6 -Alkyl, C_2 - C_4 -Cycloalkyl, C_2 - C_4 -Alkenyl, C_3 - C_6 -Alkinyl und Phenyl, das ggf. mit bis zu 2 Chloroder Fluoratomen, Methylgruppen, Trifluormethylgruppen oder Methoxygruppen substituiert ist, steht.

2. Verfahren zur Herstellung von Mitteln zur Entblätterung von Pflanzen, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß man eine wirksame Menge der Verbindung der Formel I mit mindestens einem festen oder flüssigen Trägerstoff sowie ggf. mit einem oder mehreren oberflächenaktiven Mitteln mischt.

3. Verfahren zur Entblätterung von Pflanzen, dadurch gekennzeichnet, daß man ein Mittel gemäß Anspruch 1 auf Pflanzen oder deren Lebensraum einwirken läßt.

50

55



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

EP 87 10 4956

	EINSCHLÄ	GIGE DOKUMENT	E	<u> </u>	
ategorie		ents mit Angabe, soweit erfor Sgeblichen Teile	derlich.	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. CI 4)
х	FR-A-1 598 961 * Patentanspri Zeilen 29-35 *	(BAYER) iche; Seite	4,	1-3	A 01 N 47/36 C 07 D 285/12
x	CH-A- 554 886 * Spalte 5, Zeil	(AIR PRODUCTS en 2-3 *)	1-3	
x	FR-A-2 001 083 * Patentanspruch			1,2	
x	FR-A-2 003 832 * Patentansprüch)	1,2	
x	FR-A-2 007 069 INDUSTRY) * Patentansprüch	•	AL	1,2	RECHERCHIERTE
ĸ	US-A-3 972 706 * Patentanspruch Zeile 10 - Spalt	1; Spalte	16,	1,2	A O1 N
	US-A-3 990 879 * Patentanspruc Zeilen 31-62 *		9,	1,2	
		/-			
				:	
Der	vortregende Recherchenbericht wur	de für alle Patentansprüche er	rstelit.		
	DEN HAAG	Abschlußdatum der Ri 13-08-1987	echerche 7	DECO	Pruter RTE D.
K: von Y: von and A: tecl D: nicl	TEGORIE DER GENANNTEN DO besonderer Bedeutung allein t besonderer Bedeutung in Vert leren Veröffentlichung derselbe n logischer Hintergrund mtschnftliche Offenbarung schenliteratur	etrachtet indung mit einer [in Kategorie i	D: in der An: .: aus ande	meldung ang rn Gründen i	ent, das jedoch erst am oder tum veröffentlicht worden is jeführtes Dokument - angeführtes Dokument Patentfamilie, überein- nt

EPA Form 1503 03 82

EPA Form 1503 03 82

EP 87 10 4956

EINSCHLÄGIGE D KUMENTE			Seite 2		
itegone	Kennzeichnung des Dokur der m	nents mit Angabe, soweit erforder aßgeblichen Teile	lich,	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
x	CENTRAL PATENTS ABSTRACTS JOURNA Woche V12, 1974, Nr. 22089V/12, I Publications Ltd JP-A-74 008 253 IND CO) 25-02-19	AL, Sektion C, Zusammenfassun Derwent l, London, GB; & (KUMIAI CHEMICA	g	1,2	
.!		· 			
					·
					RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
					•
Der	vorliegende Recherchenbericht wur	rde für alle Patentansprüche erste	liq.		
	DEN HAAG	Abschlußdatum der Recht		DECOR	Pruter CTE D.
: von	TEGORIE DER GENANNTEN D besonderer Bedeutung allein besonderer Bedeutung in Verl deren Veröffentlichung derselb hnologischer Hintergrund htschriftliche Offenbarung	betrachtet bindung mit einer D:	nach dem Anm	Anmeidedat eidung ang	ent. das jedoch erst am oder tum veröffentlicht worden ist geführtes Dokument angeführtes Dokument